

Fișă de evaluare/intervenție într-o exacerbare astmatică

Data: ora

Nume	Prenume	Vârstă	Cunoscut cu astm	Da	Nu
Dg anterior	Data Ex anterioară:		Data ultima spitalizare:		
Tratament în ultima săptămână					
Categorie	Denumire comercială		Doză	Observații	
BADSA					
Combi: CSI/BADLA					
Teofiline					
Antileukotriene AL					
Corticosteroizi oral					

ATENȚIE: o singură caracteristică este suficientă pentru a include pacientul în forme mai severe!!

Criterii	Episod actual	ExA non-severă	ExA severă	ExA amenințătoare de viață (ExA severă plus oricare)
Dispnee		La mers/vorbind	În repaus	
Vorbire		În fraze	NU poate termina o propoziție într-o respirație	Poate spune doar cuvinte
Aspect/stare de conștiență		Relativ normal/agitat?	De obicei agitat	Cianotic Epuizat, confuz, comatos,
FR		FR < 25 respirații/min	FR ≥ 25 respirații/min	Efort resp. slab/ silențiu respirator
AV		AV < 110/min	AV ≥ 110/min	Bradicardie/aritmie
TA				Tas < 90, Tad < 60 mmHg
PEF		PEF > 50% maxim/prezis	PEF 33 - 50% maxim/prezis	PEF < 33% maxim/prezis
SaO2		SaO2 > 95%	SaO2 < 92-95%	SaO2 < 92%
Decizie:		Management ambulator	Consideră trimitere spital	Trimitere spital imediat 112

Intervenție în cabinet: a. Administreză tratamentul recomandat până la venirea salvării (schemă adaptată*)

Medicament	Ordinea preferințelor	Ordinea preferințelor	Ordinea preferințelor
2. Ventolin pMDI+spacer	2/3 plus 4* 4 -10 puff la Δt de 10-20 min	6 plus 2/3 plus 4/5 4 -10 puff la Δt de 10-20 min	6 plus 4/5 plus 2/3 plus 7 4 -10 puff la Δt de 10-20 min plus 8 puff a 20 µg (la 4-6h)
3. Ventolin Nebulizare (de preferat generată de O2)	5 mg	5 mg	5 mg + 0,5 mg ipratropium
4. Prednison	30-40 mg la PEF 50-75%	40-60 mg po	40-60 mg po
5. HHC		1.v. 100 mg/6 ore	1.v. 100 mg/6 ore
6. Oxigen (dacă e disponibil)		40-60%	40-60%
7. Ipratropium			0,5 mg

În schema originală prima în ordinea preferințelor- 1- este nebulizarea generată de O2 – în prezent nu poate fi realizată în cab. MF

Intervenție în cabinet: b. Revaluează cazul (Ex non severă, Ex severă) după 1 oră, în caz că nu ai chemat 112. În caz de răspuns bun (PEF >80%), menținut, oferă trat. acasă și revaluezeți cazul după

Tratament	Categorie	Denumire comercială	Doză	Observații
BADSA				
Combi: CSI/BADLA				
Teofiline				
Antileukotriene AL				
Corticosteroizi oral				

In caz de raspuns nesatisfăcător/ orice alt dubiu privind posibilitate/complianța la tratament – recomandă**Internarea +/- Apelează 112**