

BOLI CU TRANSMITERE SEXUALĂ

Tip de intervenție preventivă	Consilierea comportamentală pentru prevenirea răspândirii bolilor cu transmitere sexuală (BTS)		
Populația	Toți adolescenții activi sexual	Adulți cu risc crescut pentru BTS	Adolescenți fără activitate sexuală și adulți fără risc pentru BTS
Recomandarea	Se oferă consiliere intensivă. B	Se oferă consiliere intensivă. B	Nu există recomandare. I (nu există suficiente dovezi)

Evaluarea riscului	<p>Toți adolescenții activi sexual se consideră a fi cu risc crescut de infecție BTS și trebuie consiliați.</p> <p>Adulții la risc crescut sunt cei care:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Au sau au avut o boală cu transmitere sexuală în ultimul an. • Au mai mulți parteneri sexuali. <p>În comunitățile sau populațiile cu rata crescută de BTS se consideră la risc toate persoanele active sexual care nu sunt, în prezent, într-o relație monogamă.</p>		
Intervenția	<p>Caracteristicile unei intervenții de consiliere intensivă sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesiuni multiple de consiliere. • Consiliere de grup. 		
Sugestii pentru implementare	<p>Consilierea intensivă se poate face în cabinetele de medicină primară sau alte sectoare ale sistemului de sănătate și comunitare la recomandarea medicului de medicină primară.</p> <p>Acest serviciu poate fi mult îmbunătățit de o legătură strânsă între cabinetul de medicină primară și comunitatea pe care o deserveste.</p>	<p>Dovezile sunt limitate privind consilierea adolescenților fără activitate sexuală. Consilierea intensivă a tuturor adolescenților pentru a ajunge la cei care sunt cu risc crescut dar nu au fost identificați nu este dovedită că eficiența. Nu există dovezi privind consilierea adulților fără risc de infecție BTS.</p>	

Sursa <http://www.uspreventiveservicestaskforce.org>.